

ബന്ധക്രമീകരണ വിഭാഗം

ഗവ. ബന്ധൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

ബന്ധക്രമീകരണ വിഭാഗത്തിലെ ചികിത്സയ്ക്കായി താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന തോടൊപ്പം ചികിത്സയുടെ കാലയളവിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചികിത്സയുടെ വിജയം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ആനുപാതികമാണ്. നൃതന ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ ഡോക്ടർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഈ പരിപൂർണ്ണമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

എടുത്ത മാറ്റാവുന്ന ഉപകരണം (removable appliance)

- ബന്ധക്രമീകരണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ കമ്പി 24 മണിക്കൂറും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്, കമ്പി മുന്നാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർനാൽ മർദ്ദം പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- ആഹാരം കഴിക്കുന്നോഴും വായ് വൃത്തിയാക്കുന്നോഴും പല്ലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണം എടുത്തുമാറ്റുകയും ധാതോരുവിയ കേടുപാടും വരാതെയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.
- ഉപകരണം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
- ദിവസേന രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച ബൈഷ്ണവ പേരും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
- കട്ടികുടിയ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ബന്ധക്രമീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ബന്ധക്രമീകരണ സമയത്ത് ആഹാര രീതി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൂയിംഗം ഒഴിവാക്കുക.
- പല്ലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയുടെ മേൽ വിരലോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ വച്ച് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ പാടില്ല. ബന്ധക്രമീകരണ ഉപകരണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്.

7. ഓരോ പ്രാവശ്യം ചികിത്സയ്ക്കായി വരുമ്പോഴും ഓ.പി. ടിക്കർ, അപ്പോയ്മെന്റ് കാർഡ് എന്നിവ കുടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
8. ദന്തക്രമീകരണ ചികിത്സയുടെ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾക്ക് നേരിയ വേദനയും ഇളക്കവും സാധാരണമാണ്. ഇതിലേക്കായി യോക്കുന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കുകയും, നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന തുമാണ്.
9. ദന്തക്രമീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ ഉമിനീർ വരിക, സംസാരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാവുന്നതുമാണ്. ഈത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്.
10. ചുടുവെള്ളൂത്തിലോ, ബീച്ചിംഗ് പദ്ധതിലോ എടുത്തുമാറ്റാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല.
11. ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ക്രമീകരിക്കാതെ ദന്തക്രമീകരണ വിഭാഗത്തിൽ വരിക
12. വായിൽ നിന്നും ഉപകരണം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാം കേണ്ടതും ഉപകരണത്തിന് കേടുപാട് പറ്റാതെ ചെയ്യണ്ടതുമാണ്.
13. സ്ക്രൂ (screw) എടപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വീടിൽ വച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈത് പുർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഉപകരണത്തിന് കേടുപാട് കൂടാതെ ചെയ്യണ്ടതുമാണ്.

വായിൽ സ്ഥിരമായി എടപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണം (fixed appliance)

1. യോക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ബൈഷ്യം പേസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുകളും ഉപകരണവും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആഹാരം കഴിച്ചേണ്ടം വൃത്തിയാക്കുക. ബൈഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപകരണത്തിന് കേടു വരാതെ സുക്ഷിക്കുക. എല്ലാ ആഹാരത്തിനു ശേഷവും രാത്രി ഉരങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പും ബൈഷ് ചെയ്യണ്ടതാണ്.
2. യോക്കർ ഏളുവെറിയ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂത്ര വാഷ്കുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂത്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ, കട്ടികുടിയതോ ആയ അഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
4. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉപകരണത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കാലതാമസം വരുന്നതാണ്.
5. ചികിത്സയുടെ ആരംഭത്തിൽ ചെറുതായി വേദനയും പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് 72 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സാധരണനിലയിലേക്ക് ആകുന്നതാണ്.
6. ഡോക്ടർ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂത്യമായ അളവിലും സമയത്തും കഴിക്കേണ്ടതാണ്.
7. ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡി സംശയങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.
8. ചികിത്സയ്ക്ക് കാലതാമസം വരികയോ, തടസ്സം നേരിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.